

貯法：室温保存  
有効期間：3年

	錠 50 小児用	ドライシロップ 10% 小児用
承認番号	20300AMZ00252000	21800AMX10891000
販売開始	1991年10月	1996年12月

## マクロライド系抗生物質製剤

日本薬局方 クラリスロマイシン錠

処方箋医薬品<sup>註)</sup> **クラリス錠 50 小児用**  
*Clarith tablets 50 for pediatric*

日本薬局方 シロップ用クラリスロマイシン

処方箋医薬品<sup>註)</sup> **クラリスドライシロップ 10% 小児用**  
*Clarith dry syrup 10% for pediatric*

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- \*\* 2.1 本剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.2 ピモジド、エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・イソプロピルアンチピリン、ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩、スポレキサント、ロミタピドメシル酸塩、タダラフィル〔アドシルカ〕、チカグレロル、イブルチニブ、アスナプレビル、ダクラタスビル塩酸塩・アスナプレビル・ベクラブビル塩酸塩、イバプラジン塩酸塩、ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期）、ルラシドン塩酸塩、アナモレリン塩酸塩を投与中の患者 [10.1 参照]
- 2.3 肝臓又は腎臓に障害のある患者でコルヒチンを投与中の患者 [9.2.1、9.3.1、10.2 参照]

### 3. 組成・性状

#### 3.1 組成

販売名	クラリス錠 50 小児用	クラリスドライシロップ 10% 小児用
有効成分	1錠中 日局 クラリスロマイシン 50mg（力価）	1g 中 日局 クラリスロマイシン 100mg（力価）
添加剤	低置換度ヒドロキシプロピルセルロース トウモロコシデンプン 軽質無水ケイ酸 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム ヒドロキシプロピルセルロース ステアリン酸マグネシウム 硬化油 カルナウバロウ パラフィン シヨ糖脂肪酸エステル ポリソルベート 80 ポリビニルアルコール（部分けん化物） ヒプロメロース 酸化チタン	モノステアリン酸グリセリン アミノアルキルメタクリレートコポリマー E アンモニオアルキルメタクリレートコポリマー ソルビン酸 水酸化ナトリウム ポリソルベート 80 カルメロースナトリウム 軽質無水ケイ酸 酸化マグネシウム D-マンニトール トウモロコシデンプン ヒドロキシプロピルセルロース サッカリンナトリウム水和物 メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 三酸化鉄 香料

#### 3.2 製剤の性状

販売名	識別コード	剤形	外形・サイズ等		
			上面	下面	側面
クラリス錠 50 小児用	T17	白色 フィルム コーティング錠			
			直径 (mm)	厚さ (mm)	重量 (mg)
			約 6	約 3.5	約 84
クラリスドライシロップ 10% 小児用	T16 (分包)	微赤白色の粉末			

#### 4. 効能又は効果

##### ○一般感染症

##### 〈適応菌種〉

本剤に感性的ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、モラクセラ（ブランハメラ）・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、百日咳菌、カンピロバクター属、クラミジア属、マイコプラズマ属

##### 〈適応症〉

表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎、猩紅熱、百日咳

##### ○後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症

##### 〈適応菌種〉

本剤に感性的マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）

##### 〈適応症〉

後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス（MAC）症

#### \*5. 効能又は効果に関連する注意

〈一般感染症：咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、感染性腸炎、中耳炎、副鼻腔炎〉

「抗微生物薬適正使用の手引き」<sup>1)</sup>を参照し、抗菌薬投与の必要性を判断した上で、本剤の投与が適切と判断される場合に投与すること。

## 6. 用法及び用量

効能・効果	用法・用量	
	錠	ドライシロップ
一般感染症	通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1kgあたり10～15mg（力価）を2～3回に分けて経口投与する。 レジオネラ肺炎に対しては、1日体重1kgあたり15mg（力価）を2～3回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1kgあたり10～15mg（力価）を2～3回に分けて経口投与する。 レジオネラ肺炎に対しては、1日体重1kgあたり15mg（力価）を2～3回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。
後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性マイコバクテリアウム・アビウムコンプレックス（MAC）症	通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1kgあたり15mg（力価）を2回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。	用時懸濁し、通常、小児にはクラリスロマイシンとして1日体重1kgあたり15mg（力価）を2回に分けて経口投与する。 なお、年齢、症状により適宜増減する。

## 7. 用法及び用量に関連する注意

### 〈一般感染症〉

- 7.1 小児の1日投与量は成人の標準用量（1日400mg）を上限とすること。
- 7.2 免疫不全など合併症を有さない軽症ないし中等症のレジオネラ肺炎に対し、1日400mg分2投与することにより、通常2～5日で症状は改善に向う。症状が軽快しても投与は2～3週間継続することが望ましい。また、レジオネラ肺炎は再発の頻度が高い感染症であるため、特に免疫低下の状態にある患者などでは、治療終了後、更に2～3週間投与を継続し症状を観察する必要がある。なお、投与期間中に症状が悪化した場合には、速やかにレジオネラに有効な注射剤（キノロン系薬剤など）への変更が必要である。[8.1 参照]
- 7.3 レジオネラ肺炎の治療において単独で使うことが望ましいが、患者の症状に応じて併用が必要な場合には以下の報告を参考に併用する薬剤の特徴を考慮し選択すること。

- 7.3.1 中等症以上の患者にリファンピシンと併用し有効との報告がある。
- 7.3.2 *in vitro* 抗菌力の検討において、本剤とレボフロキサシン又はシプロフロキサシンとの併用効果（相乗ないし相加作用）が認められたとの報告がある。

### 〈後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性 MAC 症〉

- 7.4 国内外の最新のガイドライン<sup>2)</sup>等を参考に併用療法を行うこと。
- 7.5 臨床的又は細菌学的な改善が認められた後も継続投与すべきである。[8.1 参照]

## 8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤の使用にあたっては、耐性菌の発現等を防ぐため、原則として感受性を確認し、疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。[7.2、7.5 参照]
- 8.2 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症があらわれることがあるので、定期的に検査を行うなど観察を十分に行うこと。[11.1.4 参照]

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

### 9.1 合併症・既往歴等のある患者

- 9.1.1 他のマクロライド系薬剤に対して過敏症の既往歴のある患者
- 9.1.2 心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者  
QT 延長、心室頻拍（Torsades de pointes を含む）、心室

細動をおこすことがある。[11.1.2 参照]

### 9.2 腎機能障害患者

本剤の血中濃度が上昇するおそれがある。[16.6.1 参照]

#### 9.2.1 腎機能障害患者でコルヒチンを投与中の患者

投与しないこと。コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状が報告されている。[2.3、10.2 参照]

### 9.3 肝機能障害患者

肝機能障害を悪化させることがある。[11.1.3 参照]

#### 9.3.1 肝機能障害患者でコルヒチンを投与中の患者

投与しないこと。コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状が報告されている。[2.3、10.2 参照]

### 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。動物実験で、母動物に毒性があらわれる高用量において、胎児毒性（心血管系の異常、口蓋裂、発育遅延等）が報告されている。なお、国外における試験で次のような報告がある。SD系ラット（15～150mg/kg/日）及びCD-1系マウス（15～1,000mg/kg/日）において、それぞれ母動物に毒性があらわれる最高用量でラット胎児に心血管系異常並びにマウス胎児に口蓋裂が認められた。また、サル（35～70mg/kg/日）において、母動物に毒性があらわれる70mg/kg/日で9例中1例に低体重の胎児がみられたが、外表、内臓、骨格には異常は認められなかった。

### 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。ヒト母乳中へ移行することが報告されている。なお、動物実験（ラット）の乳汁中濃度は、血中濃度の約2.5倍で推移した。

### 9.7 小児等

低出生体重児及び新生児を対象とした臨床試験は実施していない。

### 9.8 高齢者

一般に生理機能が低下しており、高い血中濃度が持続するおそれがある。[16.6.2 参照]

## 10. 相互作用

本剤は主としてCYP3Aにより代謝される。また、本剤はCYP3A、P-糖蛋白質（P-gp）を阻害する。[16.4、16.7.1 参照]

### 10.1 併用禁忌（併用しないこと）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ピモジド <sup>3)</sup> 〔オーラップ〕 [2.2、16.7.1 参照]	QT 延長、心室性不整脈（Torsades de pointes を含む）等の心血管系副作用が報告されている。	本剤のCYP3Aに対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
エルゴタミン酒石酸塩・無水カフェイン・インプロピルアンチピリン〔クリアミン〕 ジヒドロエルゴタミンメシル酸塩 [2.2、16.7.1 参照]	血管攣縮等の重篤な副作用をおこすおそれがある。	
スボレキサント 〔ベルソムラ〕 [2.2、16.7.1 参照]	スボレキサントの血漿中濃度が顕著に上昇し、その作用が著しく増強するおそれがある。	
ロミタピドメシル酸塩〔ジャクスタピッド〕 [2.2、16.7.1 参照]	ロミタピドの血中濃度が著しく上昇するおそれがある。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
タダラフィル 〔アドシルカ〕 [2.2、16.7.1 参照]	左記薬剤のクリアランスが高度に減少し、その作用が増強するおそれがある。	本剤の CYP3A に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害され、それらの血中濃度が上昇する可能性がある。
チカグレロロ 〔プリリントラ〕 [2.2、16.7.1 参照]	チカグレロロの血漿中濃度が著しく上昇するおそれがある。	
イブルチニブ 〔イムブルピカ〕 [2.2、16.7.1 参照]	イブルチニブの作用が増強するおそれがある。	
アスナブレビル 〔スンベプラ〕 ダクラタスビル塩酸塩・アスナブレビル・ベクラピビル塩酸塩 〔ジメンシー〕 [2.2、16.7.1 参照]	肝臓に関連した副作用が発現、重症化するおそれがある。	
イバブラジン塩酸塩 〔コラン〕 [2.2、16.7.1 参照]	過度の徐脈があらわれることがある。	
** ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の用量漸増期） 〔ベネクレクタ〕 [2.2、16.7.1 参照]	腫瘍崩壊症候群の発現が増強するおそれがある。	
** ルラシドン塩酸塩 〔ラツータ〕 [2.2、16.7.1 参照]	ルラシドン塩酸塩の血中濃度が上昇し、作用が増強するおそれがある。	
** アナモレリン塩酸塩 〔エドルミズ〕 [2.2、16.7.1 参照]	アナモレリン塩酸塩の血中濃度が上昇し、副作用の発現が増強するおそれがある。	

## 10.2 併用注意（併用に注意すること）

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
ジゴキシン [16.7.1 参照]	嘔気、嘔吐、不整脈等が報告されているので、ジゴキシンの血中濃度の推移、自覚症状、心電図等に注意し、異常が認められた場合には、投与量を調節する等の適切な処置を行うこと。	本剤の腸内細菌叢に対する影響により、ジゴキシンの不活化が抑制されるか、もしくは P-gp を介したジゴキシンの輸送が阻害されることにより、その血中濃度が上昇する。
** スルホニル尿素系血糖降下剤 〔グリベンクラミド〕 〔グリクラジド〕 〔グリメピリド 等〕	低血糖（意識障害に至ることがある）が報告されているので、異常が認められた場合には、投与を中止し、ブドウ糖の投与等の適切な処置を行うこと。	機序は不明である。左記薬剤の血中濃度が上昇する可能性がある。
カルバマゼピン テオフィリン <sup>4),5)</sup> アミノフィリン水和物 シクロスポリン タクロリムス水和物 エベロリムス [16.7.1、16.7.2 参照]	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるため、左記薬剤の血中濃度の推移等に注意し、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	本剤の CYP3A に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害される。

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アトルバスタチンカルシウム水和物 <sup>6)</sup> シンバスタチン <sup>6)</sup> ロバスタチン(国内未承認) [16.7.1 参照]	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う横紋筋融解症が報告されているので、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。 腎機能障害のある患者には特に注意すること。	本剤の CYP3A に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害される。
コルヒチン [2.3、9.2.1、9.3.1、16.7.1 参照]	コルヒチンの血中濃度上昇に伴う中毒症状（汎血球減少、肝機能障害、筋肉痛、腹痛、嘔吐、下痢、発熱等）が報告されているので、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	
** ベンゾジアゼピン系薬剤 （CYP3A で代謝される薬剤） 〔トリアゾラム <sup>7)</sup> 〕 〔ミダゾラム <sup>8)</sup> 等〕 非定型抗精神病薬 （CYP3A で代謝される薬剤） 〔ケチアピピンフマル酸塩〕 アリピプラゾール 〔プロナセリン 等〕 ジソピラミド トルバプタン エプレレノン エレクトリプタン臭化水素酸塩 カルシウム拮抗剤 （CYP3A で代謝される薬剤） 〔ニフェジピン〕 ベラパミル塩酸塩 等〕 リオシグアト ジェノゲスト ホスホジエステラーゼ 5 阻害剤 〔シルデナフィルクエン酸塩 <sup>9)</sup> 〕 タダラフィル 〔シアリス、ザルティア〕 等〕 クマリン系抗凝血剤 ワルファリンカリウム ドセタキセル水和物 アペマシクリブ <sup>10)</sup> オキシコドン塩酸塩水和物 <sup>11)</sup> フェンタニル/フェンタニルクエン酸塩 [16.7.1 参照]	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるため、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。 なお、トルバプタンにおいては、本剤との併用は避けることが望ましいとされており、やむを得ず併用する場合には、トルバプタンの用量調節を特に考慮すること。	

薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
** ベネトクラクス（再発又は難治性の慢性リンパ性白血病（小リンパ球性リンパ腫を含む）の維持投与期、急性骨髄性白血病） [16.7.1 参照]	ベネトクラクスの副作用が増強するおそれがあるので、ベネトクラクスを減量するとともに、患者の状態を慎重に観察すること。	本剤の CYP3A に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害される。
抗凝固剤 (CYP3A で代謝され、P-gp で排出される薬剤) 〔アピキサバン リバーロキサバン〕 (P-gp で排出される薬剤) 〔ダビガトランエテキシラート エドキサバントシル酸塩水和物〕 [16.7.1 参照]	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性があるため、異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	本剤の CYP3A 及び P-gp に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝及び排出が阻害される。  本剤の P-gp に対する阻害作用により、左記薬剤の排出が阻害される。
** イトラコナゾール <sup>12)</sup> HIV プロテアーゼ阻害剤 〔リトナビル <sup>13)</sup> ロピナビル・リトナビル ダルナビル エタノール付加物 等〕 [16.4、16.7.1 参照]	本剤の未変化体の血中濃度上昇による作用の増強等の可能性がある。また、イトラコナゾールの併用においては、イトラコナゾールの血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性がある。異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	本剤と左記薬剤の CYP3A に対する阻害作用により、相互に代謝が阻害される。
リファブチン <sup>14)</sup> エトラビルン <sup>15)</sup> [16.4、16.7.1 参照]	左記薬剤の血中濃度上昇に伴う作用の増強等の可能性がある。また、本剤の未変化体の血中濃度が低下し、活性代謝物の血中濃度が上昇し、本剤の作用が減弱する可能性がある。異常が認められた場合には、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	本剤の CYP3A に対する阻害作用により、左記薬剤の代謝が阻害される。また、左記薬剤の CYP3A4 に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
リファンピシン <sup>16)</sup> エファビレンツ ネビラピン [16.4、16.7.1 参照]	本剤の未変化体の血中濃度が低下し、活性代謝物の血中濃度が上昇する可能性がある。本剤の作用が減弱する可能性があるため、投与量の調節や中止等の適切な処置を行うこと。	左記薬剤の CYP3A4 に対する誘導作用により、本剤の代謝が促進される。
天然ケイ酸アルミニウム <sup>17)</sup>	本剤の吸収が低下するとの報告がある。	左記薬剤の吸着作用によるものと考えられる。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

### 11.1 重大な副作用

11.1.1 ショック、アナフィラキシー（いずれも頻度不明）  
呼吸困難、痙攣、発赤等があらわれることがある。

- 11.1.2 QT 延長、心室頻拍（Torsades de pointes を含む）、心室細動（いずれも頻度不明）  
QT 延長等の心疾患のある患者、低カリウム血症のある患者においては特に注意すること。[9.1.2 参照]
- 11.1.3 劇症肝炎、肝機能障害、黄疸、肝不全（いずれも頻度不明）  
劇症肝炎、AST、ALT、 $\gamma$ -GTP、LDH、Al-P の上昇等を伴う肝機能障害、黄疸、肝不全があらわれることがある。[9.3 参照]
- 11.1.4 血小板減少、汎血球減少、溶血性貧血、白血球減少、無顆粒球症（いずれも頻度不明）  
[8.2 参照]
- 11.1.5 中毒性表皮壊死融解症（Toxic Epidermal Necrolysis : TEN）、皮膚粘膜眼症候群（Stevens-Johnson 症候群）、多形紅斑（いずれも頻度不明）  
異常が認められた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 11.1.6 PIE 症候群・間質性肺炎（いずれも頻度不明）  
発熱、咳嗽、呼吸困難、胸部 X 線異常、好酸球増多等があらわれることがある。このような症状があらわれた場合には、投与を中止し、副腎皮質ホルモン剤の投与等の適切な処置を行うこと。
- 11.1.7 偽膜性大腸炎、出血性大腸炎（いずれも頻度不明）  
偽膜性大腸炎、出血性大腸炎等の重篤な大腸炎があらわれることがある。腹痛、頻回の下痢があらわれた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11.1.8 横紋筋融解症（頻度不明）  
筋肉痛、脱力感、CK 上昇、血中及び尿中ミオグロビン上昇があらわれることがある。横紋筋融解症による急性腎障害の発症に注意すること。
- 11.1.9 痙攣（頻度不明）  
痙攣（強直間代性、ミオクロヌス、意識消失発作等）があらわれることがある。
- 11.1.10 急性腎障害、尿細管間質性腎炎（いずれも頻度不明）  
乏尿等の症状や血中クレアチニン値上昇等の腎機能低下所見が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。
- 11.1.11 IgA 血管炎（頻度不明）
- 11.1.12 薬剤性過敏症候群<sup>18)</sup>（頻度不明）  
初期症状として発疹、発熱がみられ、さらに肝機能障害、リンパ節腫脹、白血球増加、好酸球増多、異型リンパ球出現等を伴う遅発性の重篤な過敏症状があらわれることがある。投与中止後も発疹、発熱、肝機能障害等の症状が再燃あるいは遷延化することがあるので注意すること。

## 11.2 その他の副作用

### 〈一般感染症〉

	0.1～5% 未満	0.1% 未満	頻度不明
過敏症	発疹	そう痒感	
精神神経系		めまい 頭痛	幻覚 失見当識 意識障害 せん妄 躁病 眠気 振戦 しびれ（感） 錯感覚 不眠
感覚器		味覚異常 （にがみ等）	耳鳴 聴力低下 嗅覚異常

	0.1～5% 未満	0.1% 未満	頻度不明
消化器	悪心 嘔吐 胃部不快感 腹部膨満感 腹痛 下痢	食欲不振 軟便 口内炎 舌炎 口渇	口腔内びらん 胸やけ 歯牙変色 舌変色
血液	好酸球増多		
肝臓	AST 上昇 ALT 上昇 γ-GTP 上昇 LDH 上昇 ALP 上昇		
筋・骨格			筋肉痛
その他		倦怠感 浮腫 カンジダ症 発熱	動悸 CK 上昇 脱毛 頻尿 低血糖

#### 〈後天性免疫不全症候群（エイズ）に伴う播種性 MAC 症〉

	5～10% 未満	1～5% 未満	頻度不明
精神神経系		不眠症	頭痛 めまい 激越 神経過敏症 感覚異常 痙攣 妄想 幻覚 運動過多 躁病反応 偏執反応 末梢神経炎 精神病
感覚器		味覚減退	味覚倒錯 難聴 耳鳴 味覚喪失 結膜炎
皮膚		発疹	そう痒感 斑状丘疹状皮疹 ざ瘡 帯状疱疹 紫斑皮疹 光線過敏性反応 発汗
消化器	下痢	悪心 食欲不振 腹痛 嘔吐 逆流性食道炎	鼓腸放屁 消化不良 便秘 おくび 口渇 舌炎 舌変色
血液		白血球減少 貧血 再生不良性貧血 好中球減少 骨髓機能不全	
肝臓	肝機能異常	γ-GTP 上昇 ALP 上昇	AST 上昇 ALT 上昇 胆汁うっ滞性黄疸 肝炎 ビリルビン上昇
腎臓		急性腎障害	BUN 上昇 クレアチニン上昇
生殖器		子宮頸部上皮異形成	腔カンジダ症

	5～10% 未満	1～5% 未満	頻度不明
筋・骨格			筋肉痛 関節痛
その他		高脂血症 トリグリセリド 上昇 高尿酸血症 低カリウム血症 徐脈	無力症 アミラーゼ上昇 カンジダ症 疼痛 しゃっくり 発熱 胸痛 さむけ 酵素上昇

頻度は承認時の国内臨床試験及び製造販売後の使用成績調査の合算に基づいている。

#### 14. 適用上の注意

##### 14.1 薬剤交付時の注意

###### 〈錠〉

14.1.1 PTP 包装の薬剤は PTP シートから取り出して服用するよう指導すること。PTP シートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある。

###### 〈ドライシロップ〉

14.1.2 用時調製の製剤であるので、調製後の保存を避け、やむを得ず保存する必要がある場合は冷蔵庫に保存し、できるかぎり速やかに使用する旨説明すること。また、使用時、十分に振り混ぜる旨説明すること。

14.1.3 酸性飲料（オレンジジュース、スポーツ飲料等）で服用することは避けることが望ましい。有効成分の苦味を防ぐための製剤設計が施してあるが、酸性飲料で服用した場合には、苦味が発現することがある。

#### 16. 薬物動態

##### 16.1 血中濃度

小児に 5mg（力価）/kg を<sup>19)</sup>、また健康成人に 200mg、400mg（力価）を<sup>20)</sup> 空腹時単回経口投与したときの平均血清中濃度及び各パラメータの値は以下のようであった。なお、個体間のバラツキは少なかった。

	測定法	C <sub>max</sub> (μg/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC (μg·hr/mL)
小児 (n=6) 5mg/kg	HPLC 未変化体	1.05	1.4	1.8	3.54
	HPLC 代謝物	0.98	1.4	3.2	5.37
成人 (n=8) 200mg	Bioassay	1.16	1.9	4.04	8.98
成人 (n=8) 400mg	Bioassay	2.24	2.7	4.36	20.30

##### 16.2 吸収

###### 16.2.1 バイオアベイラビリティ

健康成人において、クラリスロマイシン錠剤（250mg）を経口投与した場合（2 回測定）とクラリスロマイシンラクトピオン酸塩を静脈内投与した場合の薬物速度論的パラメータを比較検討した。その結果、未変化体のバイオアベイラビリティは 52、55% であったが、初回通過効果によって生成される活性代謝物（14 位水酸化体）を含めたパラメータ解析結果から、クラリスロマイシンは経口投与後ほぼ完全に吸収されていることが示唆された<sup>21)</sup>（海外データ）。

###### 16.2.2 食事の影響

小児に 10mg（力価）/kg を単回経口投与したときの血清中濃度には、食事の影響がほとんど認められなかった<sup>22)</sup>。

##### 16.3 分布

健康成人における唾液<sup>23)</sup>、また、患者における喀痰<sup>24)</sup>、気管

支分泌物<sup>25)</sup>等への移行性を測定した結果、それぞれの組織への移行は良好で、血清中濃度と同等もしくはそれ以上の濃度を示した。また、皮膚<sup>26)</sup>、扁桃<sup>27)</sup>、上顎洞粘膜<sup>27)</sup>等の組織中濃度はほとんどの例で血清中濃度を大きく上まわった。なお、ヒト血清蛋白結合率は42~50%であった<sup>28)</sup> (*in vitro*)。

#### 16.4 代謝

ヒトにおける主代謝物は14位水酸化体であり、血清中には未変化体とはほぼ同量存在した<sup>29)</sup>。

ヒト肝ミクロソームを用いた *in vitro* 試験において、本剤は主として CYP3A で代謝されることが報告されている<sup>30)</sup>。

[10、16.7.1 参照]

#### 16.5 排泄

小児患者に5mg (力価) /kg を単回経口投与し、Bioassay で測定したところ、投与後6時間までに投与量の25.8%が尿中へ排泄された<sup>31)</sup>。

なお、健康成人に200mg (力価) を空腹時に単回経口投与したところ、尿中には主に未変化体及び活性代謝物の14位水酸化体が認められた<sup>29)</sup>。

#### 16.6 特定の背景を有する患者

##### 16.6.1 腎機能障害者

腎機能正常者と種々な程度の腎機能障害者に200mg (力価) を空腹時単回経口投与し、クレアチニンクリアランス (Ccr) とその体内動態との関係を検討した結果、腎機能の低下に伴って C<sub>max</sub> の上昇、T<sub>1/2</sub> の延長及び AUC の増加が認められた<sup>32)</sup> (測定法: Bioassay)。[9.2 参照]

クレアチニン クリアランス (mL/min)	C <sub>max</sub> (μg/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC (μg·hr/mL)
Ccr ≧ 100 (n=5)	2.02	1.24	2.38	8.89
Ccr ≧ 50 (n=5)	2.15	1.89	5.74	21.69
Ccr ≧ 30 (n=5)	2.55	0.96	4.69	18.73
Ccr ≧ 5 (n=5)	3.54	1.48	6.13	36.89

##### 16.6.2 高齢者

重篤な基礎疾患のない66~82歳 (平均72.2歳) の女性3名に200mg (力価) を空腹時単回経口投与し、その体内動態を検討した結果、健康成人と比べると T<sub>max</sub>、T<sub>1/2</sub> はほぼ同様であったが、C<sub>max</sub>、AUC は明らかに高かった<sup>33)</sup> (測定法: Bioassay)。[9.8 参照]

	C <sub>max</sub> (μg/mL)	T <sub>max</sub> (hr)	T <sub>1/2</sub> (hr)	AUC (μg·hr/mL)
高齢者 (n=3)	3.72	2.3	4.2	19.20

#### 16.7 薬物相互作用

##### 16.7.1 *in vitro* 試験成績

CYP3A、P-gp に対する阻害作用を有する。[10、16.4 参照]

##### 16.7.2 テオフィリン

健康成人男性にテオフィリンを400mg及び本剤を300mg併用した結果、併用5日目でテオフィリンの血清中濃度は C<sub>max</sub> で1.26倍、AUC で1.19倍上昇し、クリアランスは16.4%減少したが統計的に有意差は認められなかった<sup>4)</sup>。

また、気管支喘息患者にテオフィリンを300~600mg/day で1日分2経口投与し、更に本剤600mg/day を1日分2併用投与した結果、併用7日目においてテオフィリンの血清中濃度は有意な上昇を示した<sup>5)</sup>。[10.2 参照]

#### 17. 臨床成績

##### 17.1 有効性及び安全性に関する試験

###### (一般感染症)

##### 17.1.1 小児患者を対象とした国内一般臨床試験

下記の疾患に対する有効性が認められた<sup>31), 34)</sup>。なお、成人を対象とした皮膚科領域感染症<sup>35)</sup>、肺炎<sup>36)</sup>、慢性呼吸器病変の二次感染<sup>37)</sup>、扁桃炎<sup>38)</sup> に対する二重盲検比較試験

で本剤の有効性が認められた。

疾患名	有効率 (%) 【有効以上】
皮膚科領域感染症 (表在性皮膚感染症、深在性皮膚感染症、リンパ管・リンパ節炎、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染)	91.7 (22/24)
呼吸器感染症 (咽頭・喉頭炎、扁桃炎、急性気管支炎、肺炎、肺膿瘍、慢性呼吸器病変の二次感染)	93.7 (550/587)
感染性腸炎	98.9 (90/91)
耳鼻科領域感染症 (中耳炎、副鼻腔炎)	88.5 (69/78)
猩紅熱	100 (28/28)
百日咳	86.7 (39/45)

##### 〈後天性免疫不全症候群 (エイズ) に伴う播種性 MAC 症)

##### 17.1.2 小児患者を対象とした海外一般臨床試験

後天性免疫不全症候群 (エイズ) に伴う播種性 MAC 症に対する二重盲検比較試験を含む臨床試験において、本剤の有効性が認められている。小児を対象とした試験成績は次のとおりである。

疾患名	有効率 (%) 【有効以上】
後天性免疫不全症候群 (エイズ) に伴う播種性 MAC 症 (米国)	61.1 (11/18)

#### 18. 薬効薬理

##### 18.1 作用機序

細菌の70Sリボソームの50Sサブユニットと結合し、蛋白合成を阻害する<sup>39)</sup>。

##### 18.2 薬理作用

###### 18.2.1 抗菌作用

ブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌の好気性グラム陽性菌<sup>40)~44)</sup>、モラクセラ (ブランハメラ)・カタラーリス、インフルエンザ菌、レジオネラ属、百日咳菌、カンピロバクター属等の一部のグラム陰性菌<sup>40)~44)</sup>、クラミジア属<sup>45)</sup>、マイコプラズマ属<sup>44), 46)</sup> 及びマイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC)<sup>47)</sup> に抗菌作用を示し、その作用は他のマクロライド系抗生物質と同等以上である (*in vitro*)。

###### 18.2.2 ヒト主代謝物14位水酸化体の抗菌力

未変化体とはほぼ同等の抗菌力を有する<sup>48)</sup> が、マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス (MAC)<sup>49)</sup> に対しては未変化体より弱い (*in vitro*)。

###### 18.2.3 動物感染モデルに対する作用

マウスの腹腔内感染<sup>40), 41), 43), 44), 48)</sup>、皮下感染<sup>40), 43), 44)</sup>、呼吸器感染症<sup>40), 41), 44), 48)</sup> モデルにおいては、本剤の良好な組織移行性を反映し、優れた効果を示す。


#### 19. 有効成分に関する理化学的見聞

一般的名称: クラリスロマイシン (clarithromycin)

化学名: (2R,3S,4S,5R,6R,8R,10R,11R,12S,13R)-5-(3,4,6-*Trideoxy-3-dimethylamino-β-D-xyl*o-hexopyranosyloxy)-3-(2,6-dideoxy-3-C-methyl-3-O-methyl-*α-L-ribo*-hexopyranosyloxy)-11,12-dihydroxy-6-methoxy-2,4,6,8,10,12-hexamethyl-9-oxopentadecan-13-olide  
(日局に準拠)

略号: CAM

化学構造式：



分子式：C<sub>38</sub>H<sub>69</sub>NO<sub>13</sub>

分子量：747.95

性状：白色の結晶性の粉末で、味は苦い。アセトン又はクロロホルムにやや溶けやすく、メタノール、エタノール（95）又はジエチルエーテルに溶けにくく、水にほとんど溶けない。

融点：220～227℃

## 20. 取扱い上の注意

### 〈ドライシロップ〉

アルミピロー包装開封後は、湿気を避けて遮光して保存すること。

## 22. 包装

### 〈錠〉

PTP 100 錠 [10 錠×10]

PTP 500 錠 [10 錠×50]

### 〈ドライシロップ〉

プラスチックボトル 100g（乾燥剤入り）

分包 0.5g×120 包（乾燥剤入り）

## 23. 主要文献

- 1) 厚生労働省健康局結核感染症課編：抗微生物薬適正使用の手引き
- 2) Griffith DE, et al.: Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175 (4): 367-416
- 3) Desta Z, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1999; 65 (1): 10-20
- 4) 二木芳人ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 515-520
- 5) 辻本善樹ほか：日本小児アレルギー学会誌. 1989; 3 (1): 48-55
- 6) Jacobson TA.: Am J Cardiol. 2004; 94 (9): 1140-1146
- 7) Greenblatt DJ, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1998; 64 (3): 278-285
- 8) Yeates RA, et al.: Int J Clin Pharmacol Ther. 1997; 35 (12): 577-579
- 9) Hedaya MA, et al.: Biopharm Drug Dispos. 2006; 27 (2): 103-110
- 10) Kulanthaivel P, et al.: Cancer Res. 2016; 76 (14 suppl): CT153
- 11) Liukas A, et al.: J Clin Psychopharmacol. 2011; 31 (3): 302-308
- 12) Hardin TC, et al.: Pharmacotherapy. 1997; 17 (1): 195
- 13) Ouellet D, et al.: Clin Pharmacol Ther. 1998; 64 (4): 355-362
- 14) Hafner R, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1998; 42 (3): 631-639
- 15) Kakuda TN, et al.: J Antimicrob Chemother. 2014; 69 (3): 728-734
- 16) Wallace RJ Jr, et al.: J Infect Dis. 1995; 171 (3): 747-750
- 17) 高橋賢成ほか：臨床薬理. 1995; 26 (1): 149-150
- 18) 厚生労働省：重篤副作用疾患別対応マニュアル 薬剤性過敏症症候群
- 19) 坂田英明ほか：日本化学療法学会雑誌. 2009; 57 (2): 97-100

- 20) 諏訪俊男ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (12): 921-932
- 21) Chu SY, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36 (5): 1147-1150
- 22) 藤井良知ほか：Jpn J Antibiot. 1989; 42 (2): 512-541
- 23) 佐々木次郎ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 1058-1073
- 24) 古賀宏延ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 698-714
- 25) 力富直人ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 715-728
- 26) 塙伸太郎ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 950-954
- 27) 宮崎康博ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 926-934
- 28) 諏訪俊男ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 213-226
- 29) 諏訪俊男ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (12): 933-940
- 30) Suzuki A, et al.: Drug Metab Pharmacokin. 2003; 18 (2): 104-113
- 31) 藤井良知ほか：Jpn J Antibiot. 1994; 47 (10): 1283-1298
- 32) 瀧井昌英ほか：Chemotherapy. 1989; 37 (1): 15-21
- 33) 足立暁ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 660-666
- 34) 馬場駿吉ほか：耳鼻と臨床. 1999; 45 (2): 94-104
- 35) 野原望ほか：Chemotherapy. 1989; 37 (2): 172-199
- 36) 原耕平ほか：Chemotherapy. 1989; 37 (2): 200-225
- 37) 原耕平ほか：Chemotherapy. 1989; 37 (3): 314-335
- 38) 河村正三ほか：耳鼻と臨床. 1989; 35 (1): 134-151
- 39) 懸川友人ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 123-128
- 40) 小野武夫ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 1-34
- 41) 五島瑳智子ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 35-58
- 42) 横田健ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 59-70
- 43) 西野武志ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 95-110
- 44) 長手尊俊ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 129-155
- 45) 吉沢花子ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 117-122
- 46) 洲崎健ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 111-116
- 47) Brown BA, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36 (9): 1987-1990
- 48) 長手尊俊ほか：Chemotherapy. 1988; 36 (S-3): 156-169
- 49) Cohen Y, et al.: Antimicrob Agents Chemother. 1992; 36 (10): 2104-2107

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

大正製薬株式会社 メディカルインフォメーションセンター  
〒170-8633 東京都豊島区高田 3-24-1  
電話 0120-591-818

## 26. 製造販売業者等

### 26.1 製造販売



**大正製薬株式会社**  
東京都豊島区高田3-24-1